



Instrukcje dotyczące wypełniania formularza zamówienia na soczewki okularów.

Przed zakupem okularów konieczne jest uzyskanie dokładnych pomiarów od okulisty lub optyka. Dostarczy ci receptę lub szczegółowy raport dotyczący twoich dokładnych wartości. Jeśli zastanawiasz się, co to wszystko oznacza, przygotowaliśmy szybki przegląd, które wartości mają znaczenie przy zamawianiu okularów i dlaczego. Podczas wykonywania zamówienia sprawdź dokładnie wszystko, zwłaszcza, czy nie zmieszałeś parametrów prawego (R lub OD) i lewego oka (L lub OS).

Jak czytać receptę na okulary?

WIDZENIE Z DALEKA		SPH	CYL	AX	TYP SOCZEWEK
 PD: L R	R				
	L				
WIDZENIE Z BLISKA		SPH	CYL	AX	TYP SOCZEWEK
 PD: L33 R31	R	-1,75	+0,75	19	
	L	-1,25	-0,25	50	

Na przykład recepta może wyglądać mniej więcej tak. Format może się różnić w zależności od lekarza.

Niektórzy specjaliści od oczu wymieniają tylko jedną wartość PD podczas pomiaru. Jeśli tak jest, musisz podzielić go przez 2, aby uzyskać wartości prawego i lewego oka.

Sfera (SPH) - oznacza to twoją sferyczną dioptrę lub moc. Zobaczysz to jako plus (+), jeśli jesteś dalekowzroczny lub jako minus (-), jeśli jesteś krótkowzroczny. Jeśli pole dioptrii ma znak równości (=), wybierz wartość ujemną (-) w formularzu. Jeśli pole dioptrii nie jest uzupełnione lub jeśli wprowadzono tutaj wartość zero, wybierz 0,00 w naszym formularzu zamówienia.

Cylinder (CYL) - ta wartość wskazuje na stan zwany „astygmatyzmem”. Oznacza to, że rogówka ma nieregularny kształt, co koryguje cylindryczna dioptra. Jeśli Twoja recepta nie zawiera wartości CYL, podczas zamawiania wprowadź cylinder 0,00 w naszym formularzu.

Oś (AX) - wskazuje pozycję astygmatyzmu na oku, w stopniach. Jeśli przepisana wartość nie zostanie wypełniona, wpisz 0 w naszym formularzu podczas składania zamówienia.

Rozstaw źrenic (PD) - ta wartość pokazuje odległość między twoimi źrenicami w milimetrach. Dokładna odległość jest ważna, abyśmy prawidłowo wyśrodkowali soczewki w optymalnej pozycji. Dla większości ludzi odległość od źrenicy do mostka nosa wynosi 28-35 milimetrów, ale są wyjątki. Jeśli Twój lekarz lub specjalista nie dodał tego do swojej recepty, możesz to zmierzyć za pomocą naszego narzędzia do pomiaru PD (znajdującego się na naszej stronie internetowej). Jeśli zauważysz tylko 1 wartość PD na recepcie, podziel ją przez 2, aby uzyskać wartość prawego i lewego oka (na przykład: 61: 2 = 30,5).

Uzupełnij receptę

	Dioptria	Cylinder	Axis	Rozstaw źrenic
Prawe oko	-1.75 ▾	+0.75 ▾	19 ▾	31 ▾
	Dioptria	Cylinder	Axis	Rozstaw źrenic
Lewe oko	-1.25 ▾	-0.25 ▾	50 ▾	33 ▾